

Bienvenidos al Wichita Falls Endoscopy Center

Por favor lea esta información importante antes de su procedimiento.

Signos o síntomas de infección después del procedimiento

Chequéese para estos síntomas: Fiebre de 101.5 °F. o más, escalofríos o dolores por todo el cuerpo; enrojecimiento, hinchazón, calor o drenaje en el sitio de la administración intravenosa de la sedación.

Además, chequéese para los siguientes signos o síntomas. Si se presentan, por favor llame a su médico e informarle.

DOLOR DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Si siente dolor de una intensidad de más de un 5 en una escala de 0-10 antes de salir del Endoscopy Center, por favor informe a su enfermera. Si empieza a sentir dolor después de salir del Endoscopy Center, considere las siguientes formas del control de dolor:

- Ande lentamente por un rato y darse tiempo para la evacuación de los gases intestinales.
- Aplique una compresa caliente o una almohadilla eléctrica a su abdomen.
- Tome un producto de venta libre para aliviar el gas y siga las instrucciones del fabricante.

Si el dolor persiste, por favor llame a su médico.

NAUSEA Y VÓMITOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Nausea y vómitos son sucesos comunes después de la sedación. Para minimizar estos efectos secundarios, beba más fluidos para volver a hidratar su cuerpo. Si tiene nausea cuando sale, empiece su alimentación con una dieta blanda y, como disminuye la nausea, vuelve a comer su dieta normal (salvo que su médico le haya recomendado una dieta especial).

Ejemplo de una dieta blanda: Plátanos, arroz, manzanas, pan tostada

Si la nausea o vómitos persisten o si están descontrolados, por favor llame a su médico.

SANGRADO DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Si el sangrado excede la cantidad de 1 cucharada, llame a su médico.